

সেড্রিল

সেটিরিজিন ডাইহাইড্রোক্লোরাইড বিপি

উপাদান :

প্রতি ৫ মিলি (১ চা-চামচ) সিরাপে আছে
সেটিরিজিন ডাইহাইড্রোক্লোরাইড বিপি ৫ মিগ্রা।

নির্দেশনা :

এলার্জিজেনিত সর্দিতে নাক বন্ধ হওয়া, রাইনোরিয়া,
চোখ লাল হওয়া, চোখ দিয়ে পানি পড়া, চোখ
চুলকানো, চামড়ার এলার্জিজেনিত অবস্থা যেমনঃ
আমবাত, ডার্মোগ্রাফিজম, এক্জিমা এবং চর্মরোগ।
ঔষধ, খাদ্য গ্রহণের কারণে এবং কীটপতঙ্গের
কামড়ের জন্য তীব্র এলার্জিজেনিত প্রতিক্রিয়া।

মাত্রা ও সেবন বিধি :

বয়স্ক এবং ৬ বৎসরের উর্ধ্ব শিশুদের জন্য : ২ চা
চামচ (১০ মিগ্রা) দিনে ১ বার।

২ থেকে ৬ বৎসর বয়সের শিশুদের জন্য : ১ চা
চামচ (৫ মিগ্রা) দিনে ১ বার অথবা চিকিৎসকের
পরামর্শক্রমে সেব্য।

শুধুমাত্র রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে সেব্য।

আলো থেকে দূরে, শুষ্ক ও ঠান্ডা স্থানে রাখুন।

সকল ঔষধ শিশুদের নাগালের বাহিরে রাখুন।