

MONOFAST

Montelukast Sodium INN

COMPOSITION

MONOFAST 10 : Each film coated tablet contains 10.37 mg Montelukast Sodium INN equivalent to 10 mg Montelukast.

DESCRIPTION

MONOFAST (Montelukast) is a selective and orally active leukotriene receptor (CysL T₁). The cysteinyl leukotrienes (LTC₄, LTD₄, LTE₄) are products of arachidonic acid metabolism and are released from various cells, including mast cells and eosinophils. Cysteinyl leukotrienes and leukotriene receptor occupation have been correlated with the pathophysiology of asthma, including airway edema, smooth muscle contraction, and altered cellular activity associated with the inflammatory process, which contribute to the signs and symptoms of asthma.

INDICATIONS

MONOFAST is indicated for allergic rhinitis, prophylaxis and chronic treatment of asthma in adults and children

DOSAGE AND ADMINISTRATION

Age	Dose
15 years and older	10 mg/day, in the evening

MONOFAST (Montelukast) may be taken with or without food or As Directed By The Physician.

CONTRAINDICATIONS

Montelukast is contraindicated in patients who are hypersensitive to any component of this product.

SIDE-EFFECTS

Montelukast has been generally well tolerated. Side effects, which usually are mild, including gastro-intestinal disturbances, dry mouth, thirst; hypersensitivity reactions including anaphylaxis, angioedema and skin reactions; asthenia, dizziness, irritability, restlessness, headache, sleep disorders (insomnia, drowsiness, nightmares); upper respiratory tract infection, fever, arthralgia, myalgia. The overall incidence of side effects reported with montelukast was comparable to placebo.

ADVERSE EFFECT

There is an increased risk of neuropsychiatric events associated with montelukast, including aggressive behavior, depression, abnormal dreams, fatigue, somnolence.

PRECAUTIONS

Montelukast is not indicated for use in acute asthma attacks. Therapy with montelukast can be continued during acute exacerbations of asthma. Montelukast should not be used as monotherapy for the treatment and management of exercise induced bronchospasm.

Use in pregnancy and Lactation

There are no adequate and well controlled studies in pregnant women. Montelukast should be used during pregnancy only if clearly needed. Montelukast is excreted in milk. So caution should be exercised when montelukast is given to a nursing mother.

DRUG INTERACTIONS

It is reasonable to employ appropriate clinical monitoring when potent cytochrome P450 enzyme inducers, such as phenobarbital or rifampin are co-administered with montelukast.

STORAGE

Store at temperature within 30°C, protected from light & moisture. Keep out of reach of children.

SUPPLY

MONOFAST 10 : Each box contains 3x10's tablets in Alu-Alu blister pack.

Manufactured by:
Chemist Laboratories Ltd
College Row, Barishal, Bangladesh.



Revision No. 01

মনোফাস্ট

মন্টিলুকাস্ট সোডিয়াম আই.এন.এন

উপাদান

মনোফাস্ট ১০ : প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে রয়েছে ১০.৩৭ মি. গ্রা. মন্টিলুকাস্ট সোডিয়াম আই.এন.এন যা ১০ মি. গ্রা. মন্টিলুকাস্টের সমতুল্য।

বর্ণনা

মনোফাস্ট (মন্টিলুকাস্ট) মুখে সেবনযোগ্য নির্বাচিত লিউকোট্রাইন রিসেপ্টর এন্টাগনিস্ট যা সিস্টেইনাইল লিউকোট্রাইন রিসেপ্টরকে প্রতিহত করে। এরাকিডনিক এসিডের বিপাকীয় দ্রব্য হলো সিস্টেইনাইল লিউকোট্রাইন (এলটিসি৪, এলটিডি৪, এলটিই৪), যা মাস্ট সেল এবং ইসোনোফিলসহ বিভিন্ন ধরনের সেল থেকে নির্গত হয়। সিস্টেইনাইল লিউকোট্রাইনের উৎপাদন এবং রিসেপ্টরের সাথে এর বন্ধন, এ্যাজমার উপসর্গ যেমন শ্বাসতন্ত্রের শোথ, মাংসপেশীর (শুথ) সংকোচন প্রভৃতির সাথে সম্পর্কিত। ইহা প্রদাহের মাধ্যমে কোষের কার্যকারিতার পরিবর্তন করে, যার ফলে এ্যাজমার লক্ষণ ও উপসর্গ দেখা দেয়।

নির্দেশনা

GjvwR@K ivBbvBwU#mi wPwKrmvq, cyY@eq® Ges wki# i G'vRgv tiv#Mi cOwZ#laK Ges 'xN@~
মনোফাস্ট ১০ : প্রতিটি বাক্সে ৩ X ১০ টি ট্যাবলেট অ্যালু-অ্যালু প্যাকে সরবরাহ করা হয়।

সেবনবিধি ও গ্রহণমাত্রা

বয়স	মাত্রা
১৫ বছর এবং এর উর্দ্ধে বয়স্কদের	১০ মিগ্রা দৈনিক ১ বার, সন্ধ্যায়

মনোফাস্ট (মন্টিলুকাস্ট) খাবারের সাথে বা আলাদা খাওয়া যেতে পারে।

অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

প্রতিনির্দেশনা

মন্টিলুকাস্ট কিংবা এর যে কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীদের জন্য ইহা প্রতিনির্দেশিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

মন্টিলুকাস্ট সাধারণত অত্যন্ত সুসহনীয়। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াসমূহ যা সাধারণত মৃদু ধরনের, তার মধ্যে রয়েছে পরিপাকতন্ত্রের অস্বাচ্ছন্দ্য, শুকনো মুখ, তৃষ্ণা, এনাফাইলেক্সিস, এনজিওএডেমা এবং ত্বকের প্রতিক্রিয়াসহ বিভিন্ন ধরনের অতিসংবেদনশীলতা, দুর্বলতা, মাথা ঘোরানো, স্পর্শকাতরতা, অস্থিরতা, মাথাব্যথা, নিদ্রাজনিত সমস্যা (অনিদ্রা, তন্দ্রাচ্ছন্নতা, দুঃস্বপ্ন), উর্ধ্ব শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ, জ্বর, সন্ধি, বেদনা, পেশীর বেদনা। মন্টিলুকাস্ট দিয়ে সৃষ্ট পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার হার প্লাসিবোর মতই।

বিরূপ প্রভাব

মন্টিলুকাস্ট গ্রহণে নিউরোসাইকিয়াটিক ইভেন্টের ঝুঁকি রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে আক্রমণাত্মক আচরণ, বিষণ্ণতা, অস্বাভাবিক স্বপ্ন, ক্রান্তি, নিদ্রাহীনতা।

সাবধানতা

তীব্র এ্যাজমার চিকিৎসায় মন্টিলুকাস্ট নির্দেশিত নয়। তীব্র এ্যাজমার ক্ষেত্রে অন্যান্য চিকিৎসার পাশাপাশি মন্টিলুকাস্ট দিয়ে চিকিৎসা চলতে থাকবে। এস্ট্রারসাইজ সমন্বিত ব্রঙ্কোস্প্যাজমের চিকিৎসা এবং তার ব্যবস্থাপনায় মনোথেরাপি হিসেবে মন্টিলুকাস্ট নির্দেশিত নয়।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার

গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত এবং সুনিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় নাই। একান্ত প্রয়োজনীয় বিবেচিত হলে গর্ভাবস্থায় মন্টিলুকাস্ট ব্যবহার করা যেতে পারে। মন্টিলুকাস্ট মাতৃদুগ্ধে নিঃসরিত হয়। দুগ্ধদানকারী মায়াদের ক্ষেত্রে মন্টিলুকাস্ট সেবনে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

অন্যান্য ঔষধের সাথে ক্রিয়া

মন্টিলুকাস্ট ও একই সাথে শক্তিশালী সাইটোক্রেম পি ৪৫০ এনজাইম নিঃসারক ফেনোবারবিটাল অথবা রিফামপিন সেবনের ক্ষেত্রে যথোচিত পর্যবেক্ষণ করা যুক্তিযুক্ত।


সংরক্ষণ

আলো ও আর্দ্রতা থেকে দূরে ৩০° সেঃ তাপমাত্রার মধ্যে সংরক্ষণ করুন। শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

সরবরাহ

মনোফাস্ট ১০ : প্রতিটি বাক্সে ৩ X ১০ টি ট্যাবলেট অ্যালু-অ্যালু প্যাকে সরবরাহ করা হয়।

প্রস্তুতকারক :
কেমিস্ট ল্যাবরেটরীজ লিঃ
কলেজ রো, বরিশাল, বাংলাদেশ



wiwfkb bs- 01